

ジトロ（大腸 線検査）を受けられる患者様へ

（肛門からバリウムと空気を入れて大腸の 線写真を撮る検査です）

この用紙は検査当日に必ず持参してください。

ジトロ（ジトロスコブの略）とは

大腸専用の透視台で、大腸全体のきれいな 線写真が簡単に撮れるため、内視鏡と比べても大腸癌の発見率はあまり変わりません。また検査時間も短く、痛みなどの苦痛も少なく、ジトロによる大腸 線検査は内視鏡よりも優れた点の多い検査法ですが、どうしても内視鏡の方が良いという方は遠慮なく申し出て下さい。



月 日（曜日） 時 分に受付してください。

- 正確な良い検査が受けられるように、下記の処置を正しく行ってください。
- それぞれの項目を正しく実行した後、確認欄に 印をつけ検査当日にご持参ください。
- 検査食は院内コンビニで購入できます。

		指示事項	確認
検査 3 日前 (/)		<u>下剤</u> 白い錠剤 2 錠(ネキパ [®])を午後 9 時に飲んでください。	
検査 2 日前 (/)			
検査前日 (/)	午前 8 時	朝食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	正午	昼食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後 2 時	コップ 1 杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後 3 時	間食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後 4 時	コップ 1 杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後 6 時	夕食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後 7 時	コップ 1 杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後 8 時	<u>粉末の下剤</u> (テトロ [®] 1 袋)を 150ml の冷たい水に溶かしてお飲みください。	
	午後 10 時	<u>下剤</u> 赤い錠剤 2 錠(プルセド)と白い錠剤 1 錠(ネキパ [®])をコップ 1 杯の水でお飲みください。	
検査当日(/) 午前 7 時		朝食は食べずに、砂糖入りの紅茶・スポーツドリンク等をお飲みください。 <u>常備薬はお飲みください。ただし、糖尿病の薬は飲まないでください。</u>	

消化の良いお食事の例・飲食できるもの	飲食できないもの
おかゆ(塩味)、豆腐(薬味なし)、味噌汁(汁のみ)、食パン、具の入っていないスープ、うどん・そば(麺と汁のみ)、バナナ、練り梅、はちみつ、水、お茶、スポーツドリンク、透明なジュース、砂糖入りの紅茶、サイダー、コーラ、氷砂糖、透明な飴玉	野菜、きのこ類、海草類、こんにゃく、種のある果物

水の飲み方が少ないと下剤が効きませんので、出来るだけ多めに水を飲んでください。

水のような下痢便が出るのが普通です。下剤のためですので心配ありません。出来るだけ十分に排便してください。

不明な点は当院外来へお問い合わせください。(月～金の 14 時～17 時)

検査費用のめやす

宗像医師会病院 TEL 0940-37-1188

	1 割負担	3 割負担
大腸 線検査	2700円	8100円

説明者	