

抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間の目安

※ 下表の休薬期間はあくまで目安ですので、出血リスクと休薬による血栓塞栓症発症リスクに応じて判断して下さい。

分類	一般名	商品名	休薬期間の目安 周術期	消化器内視鏡診療				
				単剤		2剤併用	3剤併用	
				生検・出血 低危険度	出血高危険度	出血高危険度		
抗 血 小 板 薬	アスピリン	バイアスピリン アスピリン	アスピリン腸溶錠	7-14日休薬	休薬なし	休薬なし (血栓塞栓症の 発症リスクが低い場合、 3-5日休薬)	休薬なしor シロスタゾール置換	
	【配合錠】アスピリン・ダイアルミネート	バファリン配合錠 バッサミン配合錠	ファモター配合錠					
	【配合錠】アスピリン・ランソプラゾール	タケルダ配合錠						
	【配合錠】アスピリン・ポノブラザン	キャブピリン配合錠						
	【配合錠】アスピリン・クロピドグレル硫酸塩	コンブラビン配合錠	ロレアス配合錠					抗血小板薬2成分配合のため、アスピリン・クロピドグレル硫酸塩の項目を参照 (投与中止期間中は必要に応じて単剤の抗血小板薬の使用を考慮)
	クロピドグレル硫酸塩	ブラビックス	クロピドグレル硫酸塩	7-14日休薬 (出血リスクが高くなければ、 5-7日休薬)	休薬なし	5-7日休薬 (血栓塞栓症の 発症リスクが高い場合、 アスピリン置換or シロスタゾール置換)	アスピリン置換or シロスタゾール置換 (血栓塞栓症の 発症リスクが低い場合、 5-7日休薬)	
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン	チクロピジン塩酸塩	7-14日休薬				
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント		7-14日休薬 (出血リスクが高くなければ、7日休薬)				
	チカグレロル	ブリリント		5日休薬 (出血リスクが高くなければ、 3-5日休薬)				5日間休薬
	シロスタゾール	プレタール	シロスタゾール	3日休薬				休薬なし
イコサペント酸エチル (EPA)	エパデー	イコサペント酸エチル	7-10日休薬	1日休薬				
ベラプロストナトリウム	ドルナー	ベラプロストナトリウム	1日休薬					
	プロサイリン							
ケアロードLA	ベラサスLA							
サルボグレラート塩酸塩	アンブラーグ	サルボグレラート塩酸塩	1-2日休薬					
抗 凝 固 薬	ダビガトランエテキシラート	プラザキサ	24時間-4日休薬 (腎機能に応じて判断)	休薬なし (ピーク期 は避ける)	当日休薬	当日休薬 (抗血小板薬併用時は、 抗血小板薬の項目も参照)		
	エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ	24時間-48時間以上休薬 (出血リスク、腎機能に応じて 判断)					
	リバーロキサバン	イグザレト					リバーロキサバン	
	アピキサバン	エリキウス						
ワルファリンカリウム	ワーファリン	ワルファリンK	3-5日休薬	休薬なし 治療域内確認	休薬なし (治療域内確認) orヘパリン置換or一時的DOAC変更 (抗血小板薬併用時は、抗血小板薬の項目も参照)			
血管 拡 張 薬	リマプロストアルファデクス	リマプロストアルファデクス オパルモン	プロレナール	1-2日休薬	休薬なし	1日休薬		
冠 血 管 拡 張 薬	ジピリダモール	ペルサンチン	ジピリダモール	1-2日休薬				
	ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ	ジラゼブ塩酸塩	2-3日休薬				
	トラビジル	ロコルナール	トラビジル					
脳 循 環 ・ 代 謝 改 善 薬	イブジラスト	ケタス		3日休薬				
	イフェンプロジル酒石酸塩	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	1-2日休薬				
	ニセルゴリン	サアミオン	ニセルゴリン	3日休薬				
高 脂 血 症 薬	オメガ-3脂肪酸エチル (EPA・DHA)	ロトリガ (高脂血症治療薬)		7-10日休薬				

〈参考文献〉2020年 JCSガイドライン フォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法、抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン 直接経口抗凝固薬 (DOAC) を含めた抗凝固薬に関する追補 (2017)、日本麻酔科学会 抗血栓療法ガイドライン (2016年9月制定)、添付文書、インタビューフォーム